

Link do produktu: <https://www.maxel-cosmetics.pl/ahd-1000-plyn-do-dezynfekcji-rak-skory-i-pola-zabiegowego-1000ml-p-16443.html>



AHD 1000 Płyn do dezynfekcji rąk, skóry i pola zabiegowego 1000ml

Cena	53,00 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	AC 100137
Kod EAN	5902340982112
Producent	Medilab
Opis	AHD 1000 Płyn do dezynfekcji rąk, skóry i pola zabiegowego 1000m

Opis produktu

AHD 1000 Płyn do dezynfekcji rąk, skóry i pola zabiegowego 1000ml

Charakterystyka produktu:

- wykazuje działanie natychmiastowe
- wykazuje działanie przedłużone (powyżej 3 godzin) potwierdzone badaniami
- ma szerokie spektrum działania; działa bakteriobójczo na bakterie Gram (+) i Gram (-) (w tym na Tbc), grzybobójczo; wykazuje pełne działanie wirusobójcze wg DVV (w tym HIV, HBV, HCV)
- wykazuje skuteczne działanie nawet w obecności zanieczyszczeń organicznych, jak np. krew, albuminy
- działa bardzo delikatnie na skórę; jest dobrze tolerowany nawet przy częstym stosowaniu przez osoby o wrażliwej skórze i skłonnościach do alergii
- zawiera etanol i substancje pielęgnujące skórę
- dodatek substancji nawilżających zapobiega wysuszeniu skóry
- nie utrudnia gojenia się ran
- ułatwia zakładanie i przyleganie rękawic ochronnych
- nie pozostawia na skórze substancji chemicznych obciążających i drażniących skórę
- preparat ma przyjemny, ulotny zapach
- butelki o pojemności 1 litra dostosowane są do typowych ramieniowych dozowników ściennych

Skład chemiczny:

100 g preparatu zawiera:

- etanol - 79,9 g,
- butan-2-on - 0,75 g,
- olejki zapachowe - 0,02 g,
- stabilizator - 0,63 g,
- woda oczyszczona

Stosowanie:

Do higienicznej dezynfekcji rąk:

na uprzednio dokładnie umyte i wytarte jednorazowym ręcznikiem ręce, nanieść 3 ml preparatu. Dokładnie wcierać w skórę rąk, aż do wyschnięcia (ok. 30 sek.). Preparat stosuje się nierozcieńczony!

Do chirurgicznej dezynfekcji rąk:

na dokładnie umyte, a następnie wytarte dłonie i przedramiona nanieść 5 ml preparatu i dokładnie wcierać, aż do całkowitego wyschnięcia preparatu, zwracając szczególną uwagę na czubki palców i obrąbek naskórkowy paznokcia - zabieg powinien trwać ok. 1,5 min. Zabieg należy wykonać dwukrotnie. Preparat należy stosować nierozcieńczony!

Do dezynfekcji skóry i pola zabiegowego:

dezynfekowaną powierzchnię skóry pacjenta zwilżyć dokładnie preparatem i pozostawić do całkowitego wyschnięcia. Przed iniekcjami, pobieraniem krwi, szczepieniami, akupunkturą, zmianą opatrunków, przy zdejmowaniu szwów - odczekać minimum 15 sek. Przed operacjami i punkcjami - odczekać 1 min. Czynność należy wykonać dwukrotnie. Dezynfekcja skóry bogatej w gruczoły łojowe (np. czoło) - odczekać 10 min. Przy stosowaniu aparatury elektrycznej odczekać, aż preparat całkowicie wyschnie. Obłożenia chirurgiczne i folie nakładać na skórę po całkowitym wyschnięciu preparatu.

Akceptowany przez wszystkie sanepidy.

Dystrybutor MEDILAB, producent Lysoform GmbH Niemcy