

Link do produktu: <https://www.maxel-cosmetics.pl/dives-dehyal-hialuronidaza-1-x-10-ml-liofilizowana-hialuronidaza-w-proszku-p-16098.html>



Dives DeHyal+ Hialuronidaza 1 x 10 ml Liofilizowana hialuronidaza w proszku

Cena	129,00 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	DI 5867-1
Kod EAN	2000000175867
Producent	Dives
Opis	Dives DeHyal+ Hialuronidaza 1 x 10 ml Liofilizowana hialuron

Opis produktu

Dives DeHyal+ Hialuronidaza 1 x 10 ml Liofilizowana hialuronidaza w proszku

Liofilizowana hialuronidaza w proszku do niwelowania niepożądanych efektów i powikłań powstałych w następstwie implantacji kwasu hialuronowego. Stanowi skuteczne rozwiązanie do depolimeryzacji i hydrolizy wiązań chemicznych w usieciowanych kwasach hialuronowych. Rozpad czynnika sieciującego powoduje natychmiastową degradację kwasu i minimalizowanie negatywnych następstw i powikłań powstałych w skutek jego podania.

Wskaźniki:

- usunięcie nadmiernej ilości podanego kwasu hialuronowego (nadkorekcji)
- długotrwałe grudki lub nierówności w miejscu implantacji kwasu
- ziarniniaki typu obcego
- niepożądane przemieszczenie się wypełniacza
- przypadkowe podanie kwasu usieciowanego w tętnice lub naczynie żyłne, mogące skutkować zatorami i martwicą
- niepożądane prześwitywanie wypełniacza na skutek zbyt płytkiego zdeponowania kwasu hialuronowego
- przewlekły obrzęk na skutek kompresji naczyń lub zatrzymywania się wody w miejscu podania wypełniacza
- nietolerancja na kwas hialuronowy lub czynnik sieciujący

Przeciwwskazania:

- ciąża i laktacja
- nowotwór
- nieustabilizowana cukrzyca
- epilepsja
- choroby układu immunologicznego
- choroby krwi związane z nadmiernym krwawieniem
- nadwrażliwość lub alergia na jakikolwiek składnik preparatu w tym w szczególności na jad owadów błonkoskrzydłych oraz białko bydlęce i owcze

Składniki aktywne:

- Hialuronidaza – 1500 I.U

Sposób użycia:

Produkt aktywować poprzez dodanie 10ml soli fizjologicznej. Przed użyciem wykonać próbę uczuleniową na wewnętrznej stronie przedramienia. Odczekać 5 minut i upewnić się, że w miejscu aplikacji nie wystąpił odczyn dodatni w postaci bąbla pokrzywkowego z towarzyszącym rumieniem. Obecność samego, nienasilonego rumienia lub plamki naczyniowej traktować jako odczyn ujemny. Produkt podawać na oczyszczoną skórę do momentu uzyskania pożądanego efektu. Nie przekraczać 150 I.U / ml kwasu hialuronowego. Efekty podania produktu są natychmiastowe, a czas aktywacji w skórze wynosi 24-48 godzin. W przypadku niedostatecznych efektów, zabieg powtórzyć. Przed wykonaniem zabiegu bezwzględnie przeprowadzić wywiad medyczny, wykluczyć przeciwwskazania oraz uzyskać świadomą zgodę na wykonanie zabiegu oraz poinformować pacjenta o możliwych rezultatach i ewentualnych działaniach niepożądanych. Nieprawidłowe lub niezgodne z zaleceniami producenta

użycie produktu może prowadzić do wystąpienia powikłań i działań niepożądanych.

Działania niepożądane:

Aplikacja produktu DeHyal+ może powodować zaczerwienienie lub obrzęk w miejscu zabiegowym. Zazwyczaj zmiany te są łagodne i ustępują po kilku dniach. W skrajnie rzadkich przypadkach użycie produktu może prowadzić do ostrej reakcji alergicznej. W celu jej wykluczenia zaleca się wykonanie próby alergicznej.

Zalecenia pozabiegowe:

Aby uzyskać optymalne efekty zabiegu oraz bezpieczną rekonwalescencję należy:

- nie nakładać makijażu do 12 godzin
- unikać solarium oraz nadmiernej ekspozycji na słońce do 1 tygodnia po zabiegu
- nie narażać miejsca zabiegowego na działanie ekstremalnych niskich i wysokich temperatur

Środki ostrożności:

Przed użyciem zapoznać się z treścią ulotki. Preparat przeznaczony jest wyłącznie do użytku profesjonalnego przez lekarzy oraz personel medyczny. Przed użyciem zaleca się uzyskanie świadomej zgody na wykonanie zabiegu oraz wykonanie próby alergicznej, w celu wykluczenia ryzyka nietolerancji. Produkt aplikować tylko na zdrową skórę. Zawartość opakowania używać do jednorazowej aplikacji i nie poddawać ponownej sterylizacji. Produktu nie stosować po upływie terminu ważności oraz w przypadku, gdy ampułka jest uszkodzona lub była nieprawidłowo przechowywana.

Sterylizacja:

Zawartość ampułek została wysterylizowana gorącym powietrzem.

Okres przydatności i sposób przechowywania:

Produktu nie stosować po upływie terminu ważności oraz w przypadku, gdy opakowanie jest uszkodzone lub było nieprawidłowo przechowywane. Wyrób przechowywać w oryginalnym opakowaniu w temperaturze 15-25°C, chronić przed zamarzaniem oraz bezpośrednim działaniem promieniowania słonecznego. Zawartość opakowania używać do jednorazowej aplikacji i nie poddawać ponownej sterylizacji.

UWAGA! Produkt przeznaczony wyłącznie do użytku profesjonalnego.

[Sprawdź kosmetyki profesjonalne uzupełniające zabiegi, kosmeceutyki po zabiegu.](#)